

MEDICARE®

メディケア®シリーズ

【販売名】

コーフルS

コーフルSは、傷口の収れん作用、消炎作用、保護作用および乾燥作用を持つ酸化亜鉛に、すぐれた殺菌作用を持つアクリノールを配合することで、在宅介護・老人ホームなどでの要介護者の床ずれや、おむつかぶれなどの湿疹によく効きます。

基剤には、傷口に傷あて材などがくっつきにくい油脂性基剤であるスクワラン・オリーブ油・白色ワセリン・セタノールなどを用いています。

また、片手で開け易いキャップを採用しているため、介助者の使用にも適しています。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

飲んだり、眼科用として使用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 湿潤やただれのひどい人
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果


床ずれ、湿疹、肛門周囲炎、汗疹(あせも)、皮ふのただれ、汗疱、口唇周囲炎、くつずれ、火傷、すり傷、外傷、乳ざれ、会陰裂傷、臍帯脱落后のただれ、凍傷

用法・用量

1日1回～数回、患部に塗布又は貼用してください。

【チューブの穴のあけ方】

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。



〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)定められた用法・用量を守ってください。
- (4)外用にのみ使用してください。

成分・分量

(100g中)

成分	含量	はたらき
アクリノール	0.5g	ブドウ球菌や連鎖球菌などに対し、静菌作用及び殺菌作用があります。刺激が少なく、傷口がじゅくじゅくしていても殺菌作用は変わりません。
酸化亜鉛	5.0g	傷口などを乾燥させて皮ふに皮膜を形成し、収れん、消炎、保護および緩和な防腐作用をあらわします。

添加物として、ビタミンA油、エルゴカルシフェロール、ジパルミチン酸ピリドキシン、トコフェロール、dl-カンフル、スクワラン、オリーブ油、白色ワセリン、セタノール及び香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 衣服等に付くと着色しますので、ご使用の際は十分に注意してください。

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または次のところにお問い合わせください。

森下仁丹株式会社「お客様相談室」06-6761-0003
受付時間 平日9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

発売元 **森下仁丹株式会社**

大阪市中央区玉造1丁目2番40号
<http://www.jintan.co.jp>

製造 **協和新薬株式会社**

販売元 埼玉県草加市小山1-28-8